

Fármacos y Miastenia Gravis.

Fármacos que empeoran la Miastenia Gravis.
Anestésicos
Bloqueadores neuromusculares.
Antibióticos
Aminoglucósidos (gentamicina, neomicina, tobramicina).
Fluoroquinolonas (ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino).
Macrólidos (azitromicina, claritromicina, eritromicina).
Fármacos cardiovasculares
Betabloqueadores (atenolol, labetalol, metoprolol, propanolol).
Procainamida
Quinidina
Otros fármacos
Anticuerpos monoclonales Anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizubam).
Toxina botulínica
Cloroquina
Hidroxicloroquina
Magnesio
Penicilamina
Quinina

Fármacos generalmente bien tolerados en Miastenia Gravis pero que ocasionalmente se asocian con exacerbación.
Anestésicos
Anestésicos inhalados (isoflurano, halotano).
Anestésicos locales (lidocaína, procaína).
Antibióticos y Antivirales
Antirretrovirales (ritonavir).
Clindamicina
Metronidazol
Nitrofurantoína
Tetraciclinas (doxiciclina, tetraciclina).
Vancomicina
Antiepilépticos
Carbamazepina
Etosuximida
Gabapentina
Fenobarbital
Fenitoína

Antipsicóticos y otros fármacos usados en psiquiatría.
Butirofenonas (haloperido)
Litio
Fenotiazinas (clorpromazina, proclorperazina).
Fármacos oftálmicos
Betaxolol
Ecotiofato
Proparacaina
Timolol
Tropicamida
Otros fármacos
Cisplatino
Emetina
Fludarabina
Acetato de glatiramer
Estatinas (pravastatina, atorvastatina, simvastatina).
Interferón Alfa
Interleucina - 2
Medios de contraste yodados
Riluzole